




# **Les excroissances anormales sur les pattes des oiseaux**

Plusieurs maladies peuvent provoquer le  
développement d'excroissances et de croûtes  
sur les pattes des oiseaux.



## La gale des oiseaux ou acariose .



Elle est causée par un acarien qui se multiplie dans la peau ou la corne de ses hôtes.

Le mâle vit à la surface de la peau


La femelle creuse des galeries pour aller y pondre ses œufs.

Ces parasites microscopiques (moins de 0,5 mm)  
s'attaquent aux pattes sur lesquelles elles  
peuvent causer des dommages importants.  
(Bec)





## **La gale des oiseaux ou acariose .**




L'acariose est contagieuse et se propage par contact entre individus.

Elle se soigne avec traitements adaptés à base de solutions huileuses .

Encore faut-il pouvoir attraper l'oiseau, ce qui n'est jamais très simple lorsque celui-ci vit dans la nature.



## **La gale des oiseaux ou acariose .**




Il semblerait que les oiseaux qui sont victimes de cette gale et qui en réchappent développent une réaction immunologique importante qui les protège par la suite .

La maladie évolue lentement et se développe sur plusieurs mois (6 à 12 mois).

Elle a été observée chez une trentaine de passereaux (Fringillidés, Alaudidés, Turdidés), mais les pinsons des arbres sont plus souvent victimes que les autres .



## La gale des oiseaux ou acariose .



La gale provoque des protubérances croûteuses au niveau des pattes des oiseaux, avec parfois la présence de pustules blanchâtres





## La papillomatose

La maladie est provoquée par des papillomavirus.

Les pattes semblent porter des petits buissons épineux blancs ou jaune clair.

On appelle papillomes ces petites excroissances sur les pattes en forme d'écailles accumulées. Rarement nécrotiques

Elle est difficile à différencier de la gale.

Cela limite la mobilité de l'oiseau.

Elles peuvent aussi régresser spontanément.



# La papillomatose

Les excroissances se développent très lentement, mais elles peuvent finir par englober toute la patte.





## La pododermatite plantaire

Visuellement, on observe des callosités et gonflements en forme de gangues de boue sur lesquels apparaissent des plaies.

La maladie est surtout observée chez les oiseaux captifs.

Elle peut être due à des perchoirs trop abrasifs, un surpoids ou une carence en vitamine A.

Cette maladie est rare dans la nature.

